

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Тести з однією правильною відповіддю:

1. Викладач у ПОН – це:
 - a) Джерело знань
 - b) **Наставник та фасилітатор**
 - c) Контролер
 - d) Ілюстратор
2. Головний метод навчання у ПОН – це:
 - a) Лекція
 - b) Тестування
 - c) **Аналіз проблемних ситуацій**
 - d) Переказ
3. Студенти у ПОН працюють:
 - a) Індивідуально
 - b) **У малих групах**
 - c) Виключно з викладачем
 - d) Без обговорень
4. Особливість ПОН у медицині:
 - a) Теоретичне спрямування
 - b) **Робота з клінічними кейсами**
 - c) Ігнорування практики
 - d) Вивчення біографій
5. Основний метод діагностики слуху у новонароджених:
 - a) Отоскопія
 - b) **ОАЕ (отоакустична емісія)**
 - c) Аудіограма
 - d) Рентген
6. Яка хромосомна комбінація визначає чоловічу стать у людини?
 - a) XX
 - b) **XY**
 - c) YY
 - d) XO
7. Який ген відповідає за розвиток чоловічої статі?
 - a) FOXP2
 - b) BRCA1
 - c) **SRY**
 - d) HBA1
8. Який гормон є ключовим у формуванні чоловічих статевих органів у плода?
 - a) Естроген
 - b) **Тестостерон**
 - c) Прогестерон
 - d) Пролактин
9. Фенотипічна стать визначається:
 - a) Каріотипом

- b) **Статевими ознаками, що проявляються зовні**
 - c) Наявністю SRY-гена
 - d) Гормональним аналізом
10. Який фактор може впливати на процес статевої диференціації, окрім генетики?
- a) **Екологічні фактори**
 - b) Колір очей
 - c) Харчові звички у дорослому віці
 - d) Рівень освіти

Тестові питання з множинною відповіддю:

11. Основна мета проблемно-орієнтованого навчання:
- a) Запам'ятовування матеріалу
 - b) **Формування клінічного мислення**
 - c) Механічне відтворення
 - d) **Розвиток критичного мислення**
12. Найчастіша причина втрати слуху у дітей:
- a) **Отит**
 - b) Травма
 - c) **Менінгіт**
 - d) Мігрень
13. До сенсоневральних причин глухоти належать:
- a) **Ураження завитки**
 - b) **Хвороба Мен'єра**
 - c) **Пошкодження слухового нерва**
 - d) Сірчана пробка
14. Основні клінічні прояви втрати слуху:
- a) **Зниження чутливості**
 - b) **Відсутність реакції на звук**
 - c) **Запаморочення**
 - d) Зміна апетиту
15. Які методи належать до інструментальної діагностики?
- a) **Аудіометрія**
 - b) **Тімпанометрія**
 - c) **МРТ головного мозку**
 - d) Пальпація
16. Кондуктивна приглухуватість виникає при:
- a) **Сірчаній пробці**
 - b) **Перфорації барабанної перетинки**
 - c) Нейропатії слухового нерва
 - d) **Отосклерозі**
17. Слухові апарати застосовують при:
- a) **Сенсоневральній приглухуватості**
 - b) **Кондуктивній приглухуватості**
 - c) Гострому отиті
 - d) Вірусній інфекції
18. Які сучасні методи лікування тяжких втрат слуху?
- a) **Кохлеарна імплантація**

- b) **Слухові апарати**
- c) Масаж вуха
- d) **Медикаментозна терапія**

19. До ускладнень хронічного отиту належать:

- a) **Менінгіт**
- b) **Абсцес мозку**
- c) **Поліпи слухового проходу**
- d) Бронхіт

20. Своєчасна діагностика втрати слуху у дітей важлива тому, що:

- a) **Попереджає затримку мовного розвитку**
- b) **Покращує соціальну адаптацію**
- c) **Допомагає раніше підібрати лікування**
- d) Зменшує ризик травмування